

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 1 099 677 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
16.05.2001 Patentblatt 2001/20

(51) Int Cl.7: C07C 45/50, C07C 47/02,
B01J 31/24

(21) Anmeldenummer: 00121487.3

(22) Anmeldetag: 29.09.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI


(30) Priorität: 12.11.1999 DE 19954721

(71) Anmelder: Oxeno Olefinchemie GmbH
45764 Marl (DE)

(72) Erfinder:
• Börner, Armin, Prof. Dr.
18059 Rostock (DE)
• Hess, Dieter, Dr.
45770 Marl (DE)
• Röttger, Dirk, Dr.
45657 Recklinghausen (DE)
• Selent, Detlef, Dr.
10318 Berlin (DE)

(54) Verfahren zur Herstellung von Aldehyden aus Olefinen durch Hydroformylierung

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur katalytischen Hydroformylierung von Olefinen mit 3 bis 24 Kohlenstoffatomen, wobei als Katalysator ein Metall der 8. Nebengruppe des Periodensystems in Gegenwart eines Liganden der Formel I



mit

X =
R¹_{a-d}, R²_{a-d} =

As, Sb, P,
H, aliphatischer oder aromatischer Kohlenwasserstoffrest, aliphatische
oder aromatische Alkoxygruppe, jeweils mit 1 bis 25 Kohlenstoffatomen,
wobei R¹_{a-d} und R²_{a-d} jeweils gleich oder verschieden sein können,

EP 1 099 677 A1

EP 1 099 677 A1

Q¹, Q², Q³, Q⁴ =

n, m, o, p =

Y =

Z¹, Z² =

eingesetzt wird.

O, S, NR⁷, CR⁷R⁸, wobei R⁷ und R⁸ gleich oder verschieden und eine der Bedeutungen von R^{1a} besitzen können,

0 oder 1, mit der Maßgabe, daß entweder o oder p 1 ist,

-O-R⁵, -COOR⁵, -COOM, -SR⁵, -NR⁵R⁶, -N=CR⁵R⁶, -COR⁵, -CONR⁵R⁶,
-F, -Cl, -Br, -I

wobei R⁵ und R⁶ gleich oder verschieden sein können und H, einen aliphatischen oder aromatischen

Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 25 Kohlenstoffatomen bezeichnen und M = H, Li, Na, K oder NH₄ bedeuten und

substituierter oder unsubstituierter, aliphatischer oder aromatischer Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 75 Kohlenstoffatomen, wobei Z¹ und Z² eine kovalente Verknüpfung aufweisen können,

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Aldehyden durch Hydroformylierung von Olefinen oder Olefingemischen in Anwesenheit eines Katalysators, bestehend aus einem Metall der VIII. Nebengruppe und einem funktionalisierten Phosphonitliganden.

[0002] Aldehyde können durch katalytische Hydroformylierung (oder Oxo-Reaktion) von um ein Kohlenstoffatom kürzeren Olefinen hergestellt werden. Die Hydrierung dieser Aldehyde ergibt Alkohole, die zum Beispiel zur Herstellung von Weichmachern oder als Detergentien genutzt werden. Die Oxidation der Aldehyde liefert Carbonsäuren, die beispielsweise zur Herstellung von Trocknungsbeschleunigern für Lacke oder als Stabilisatoren für PVC verwendet werden können.

[0003] Die Art des Katalysatorsystems und die optimalen Reaktionsbedingungen für die Hydroformylierung sind von der Reaktivität des eingesetzten Olefins abhängig. Einen kompakten Überblick über die Hydroformylierung, Beispiele für Katalysatoren und ihre Einsatzgebiete, gängige großtechnische Prozesse usw. finden sich in B. Cornils, W. A. Herrmann (Ed.), "Applied Homogeneous Catalysis with Organometallic Compounds", VCH, Weinheim, New-York, Basel, Cambridge, Tokyo, 1996, Vol.1, S. 29-104. Die Abhängigkeit der Reaktivität der Olefine von ihrer Struktur ist unter anderem von J. Falbe, "New Syntheses with Carbon Monoxide", Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1980, S. 95 ff., beschrieben. Die unterschiedliche Reaktivität von isomeren Octenen ist ebenfalls bekannt (B. L. Haymore, A. van Hasselt, R. Beck, Annals of the New York Acad. Sci., 415 (1983), S. 159-175).

[0004] Über die unterschiedlichen Prozesse und Katalysatoren ist eine Vielzahl von Olefinen für die Oxidierung zugänglich. Ein mengenmäßig bedeutender Rohstoff ist Propen, aus dem n- und i-Butyraldehyd erhalten werden.

[0005] Technische Olefingemische, die als Edukte für die Oxo-Synthese verwendet werden, enthalten oftmals Olefine der verschiedensten Strukturen mit unterschiedlichen Verzweigungsgraden, unterschiedlicher Lage der Doppelbindung im Molekül und gegebenenfalls auch unterschiedlichen C-Zahlen. Ein typisches Beispiel ist Raffinat I als Mischung der C4-Olefine 1-Buten, 2-Buten und Isobuten. Besonders gilt dies für Olefingemische, die durch Di-, Tri- oder weitergehende Oligomerisierung von C₂-C₅-Olefinen oder anderen leicht zugänglichen höheren Olefinen bzw. durch Cooligomerisierung von Olefinen entstanden sind. Als Beispiele für technische Olefingemische, die durch Hydroformylierung zu den entsprechenden Aldehydgemischen umgesetzt werden können, seien Tri- und Tetrapropene sowie Di-, Tri- und Tetrabutene genannt.

[0006] Die Produkte der Hydroformylierung sind durch die Struktur der Einsatzolefine, das Katalysatorsystem und die Reaktionsbedingungen bestimmt. Unter Bedingungen, bei denen es zu keiner Verschiebung der Doppelbindung im Olefin kommt, im Folgenden als nicht-isomerisierende Bedingungen bezeichnet, wird die Formylgruppe an der Stelle im Molekül eingeführt, an der sich die Doppelbindung befand, wobei wiederum zwei unterschiedliche Produkte entstehen können. So kann beispielsweise bei der Hydroformylierung von 1-Penten Hexanal und 2-Methylpentanal gebildet werden. Bei der Hydroformylierung unter isomerisierenden Bedingungen, bei der neben der eigentlichen Oxidierung auch eine Verschiebung der Doppelbindung im Olefin stattfindet, würde bei der Hydroformylierung von 1-Penten zusätzlich 2-Ethylbutanal als Produkt zu erwarten sein.

[0007] Sind als Folgeprodukt der Oxoaldehyde Alkohole für die Herstellung von Detergentien und Weichmachern angestrebt, so sollen durch die Oxoreaktion möglichst lineare Aldehyde hergestellt werden. Die hieraus erhältlichen linearen Alkohole können zu den entsprechenden Phthalaten umgesetzt werden; diese Phthalate besitzen besonders vorteilhafte Eigenschaften wie z. B. eine niedrige Viskosität.

[0008] Die oben genannten technischen Olefingemische enthalten oftmals nur geringe Anteile an Olefinen mit endständiger Doppelbindung. Um aus ihnen Produkte herzustellen, in denen mehr terminal oxidiertes Olefin vorliegt, als im ursprünglichen Olefingemisch Olefine mit endständiger Doppelbindung, muß unter isomerisierenden Bedingungen hydroformyliert werden. Geeignete Verfahren dafür sind beispielsweise Hochdruck-Hydroformylierungen mit Kobaltkatalysatoren. Diese Verfahren haben jedoch den Nachteil, daß relativ viel Nebenprodukte, zum Beispiel Alkane, Acetale oder Ether gebildet werden.

[0009] Bei der Verwendung von Rhodiumkomplexen als Katalysator für Oxoreaktionen ist der Ligand für die Produktzusammensetzung der Aldehyde mitbestimmend. Rhodiumcarbonyle ohne Phosphor-, Arsen- oder Stickstoffhaltige Liganden (unmodifizierter Rhodiumkatalysator) katalysieren die Hydroformylierung von Olefinen mit endständigen und innenständigen Doppelbindungen, wobei die Olefine auch verzweigt sein können, zu Aldehyden mit einem hohen Verzweigungsgrad. Der Anteil an terminal oxidiertem Olefin ist, im Vergleich zum Kobalt-oxidierten Produkt, deutlich geringer.

[0010] Mit ligandmodifizierten Rhodium-Katalysatoren, bestehend aus Rhodium und Triorganophosphin, z. B. Triphenylphosphin werden α -Olefine mit hoher Selektivität terminal hydroformyliert. Eine Isomerisierung der Doppelbindungen und/oder die Hydroformylierung der innenständigen Doppelbindungen tritt kaum auf. Mit Hilfe von Katalysatorsystemen, die sterisch anspruchsvolle Phosphitliganden enthalten, wird zwar eine isomerisierende Hydroformylierung erreicht, allerdings sind die Ausbeuten an endständig oxidierten Olefinen, die innenständige Doppelbindungen an Verzweigungsstellen enthalten, nicht zufriedenstellend. Eine Übersicht über den Einfluß von Liganden auf die Aktivität

und Selektivität bei der Hydroformylierung findet sich im oben zitierten Buch von B. Cornils und W. A. Hermann. Verglichen mit Phosphin- oder Phosphitliganden finden sich in der Fachliteratur nur wenige Publikationen zum Einsatz von Phosphonigsäurediestern (im Folgenden Phosphonite genannt) als Liganden in Oxierungsreaktionen. In WO 98/43935 werden Katalysatorsysteme, bestehend aus Rhodium, einem Triorganophosphonit-Liganden oder einen zweizähnigen Phosphonitliganden für die Hydroformylierung von acyclischen, cyclischen Olefinen bzw. Olefingemischen beschrieben.


[0011] JP-OS Hei 9-268152 offenbart die Verwendung von acyclischen Phosphonitliganden für Hydroformylierungsreaktionen. Diese acyclischen Liganden sind nur aufwendig herzustellen und daher für einen großtechnischen Prozeß ungeeignet.

[0012] JP-OS 9-255610 beschreibt analog die Verwendung von cyclischen Phosphoniten. Hier bildet ein Bisarylssystem mit je einem Phosphor- und Sauerstoffatom ein Phenanthren-ähnliches Gerüst, an das über ein weiteres Sauerstoffatom ein gegebenenfalls substituierter Arylrest gebunden ist. Systeme dieser Art sind in Bezug auf die Selektivität von Hydroformylierungsreaktionen noch verbesserungsfähig.

[0013] Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, ein Verfahren zur Hydroformylierung von Olefinen unter Verwendung von Phosphonitliganden bereitzustellen, mit dem verzweigte, unverzweigte, end- oder innenständige Olefine mit hohen Ausbeuten und Selektivitäten terminal oxidiert werden können, d.h. möglichst lineare Aldehyde hergestellt werden können.

[0014] Es wurde überraschend gefunden, daß Hydroformylierungen von Olefinen unter Katalyse von Metallkomplexen, bestehend aus einem Metall der 8. Nebengruppe und Phosphoniten, Arseniten und Stibenoiten mit hohen Ausbeuten und Selektivitäten zu linearen, endständig oxidierten Olefinen führt.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher ein Verfahren zur katalytischen Hydroformylierung von Olefinen mit 3 bis 24 Kohlenstoffatomen, wobei als Katalysator ein Metall der 8. Nebengruppe des Periodensystems in Gegenwart eines Liganden der Formel I



mit

X = As, Sb, P,

$R^1_{a-d}, R^2_{a-d} =$ H, aliphatischer oder aromatischer Kohlenwasserstoffrest, aliphatische oder aromatische Alkoxygruppe, jeweils mit 1 bis 25 Kohlenstoffatomen, wobei R^1_{a-d} und R^2_{a-d} jeweils gleich oder verschieden sein können,


$Q^1, Q^2, Q^3, Q^4 =$ O, S, NR^7 , CR^7R^8 , wobei R^7 und R^8 gleich oder verschieden und eine der Bedeutungen von R^1_a besitzen können, mit der Maßgabe, daß entweder Q^3 oder Q^4 O, S, NR^7 bedeuten,



n, m, o, p = 0 oder 1, mit der Maßgabe, daß entweder o oder p 1 ist,
 Y = -O-R⁵, -COOR⁵, -COOM, -SR⁵, -NR⁵R⁶, -N=CR⁵R⁶, -COR⁵, -CONR⁵R⁶, -F, -Cl, -Br, -I wobei R⁵
 und R⁶ gleich oder verschieden sein können und H, einen aliphatischen oder aromatischen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 25 Kohlenstoffatomen bezeichnen und M = H, Li, Na, K oder NH₄
 bedeuten und

Z¹, Z² = substituierter oder unsubstituierter, aliphatischer oder aromatischer Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 75 Kohlenstoffatomen, wobei Z¹ und Z² eine kovalente Verknüpfung aufweisen können,

eingesetzt wird.

[0015] In besonderen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung können auch Liganden der Formeln II, III oder IV eingesetzt werden:





[0016] Die Reste R^1_{a-d} , R^2_{a-d} , R^3_{a-e} und R^4_{a-e} bedeuten in diesen Formeln jeweils H, aliphatischer oder aromatischer Kohlenwasserstoffrest, eine aliphatische oder aromatische Alkoxygruppe, jeweils mit 1 bis 25 Kohlenstoffatomen, wo-

EP 1 099 677 A1

bei R^1_{a-d} , R^2_{a-d} , R^3_{a-e} , R^4_{a-e} jeweils gleich oder verschieden sein können. So kann z. B. R^1_a eine Methyl- und R^1_b eine Methoxygruppe bezeichnen; analoges gilt für die Reste R^2_{a-d} , R^3_{a-e} , R^4_{a-e} .


Q^1 und Q^2 stehen jeweils für O, S, NR^7 einen Methylenrest CR^7R^8 , wobei R^7 und R^8 gleich oder verschieden und eine der Bedeutungen von R^1_a besitzen können. Q^3 und Q^4 stehen jeweils für einen Methylenrest CR^7R^8 , wobei R^7 und R^8 gleich oder verschieden und eine Bedeutung von R^1_a besitzen können. Die Indices n, m, o und p stehen jeweils für 0 oder 1, ggf. mit der Maßgabe, daß entweder o oder p 1 ist.

[0017] Y steht für $-O-R^5$, $-COOR^5$, $-COOM$, $-SR^5$, $-NR^5R^6$, $-N=CR^5R^6$, $-COR^5$, $-CONR^5R^6$, $-F$, $-Cl$, $-Br$, $-I$ wobei R^5 und R^6 gleich oder verschieden sein können und H, einen aliphatischen oder aromatischen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 25 Kohlenstoffatomen bezeichnen und M = H, Li, Na, K oder NH_4 bedeuten.


[0018] X bezeichnet wie in Formel I die Elemente As, Sb oder P.

[0019] Liganden, die im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzt werden können, sind beispielsweise:


Tabelle 1




I-a




I-b




I-c




I-d




I-e




I-f




I-g




I-h




II-a




II-b




II-c




II-d




II-e




II-f



II-g



II-h



[0020] Die im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten Liganden der Formel I, II, III oder IV werden im Folgenden jeweils als heterofunktionalisierte Phosphonite, Arsenonite oder Stibonite bezeichnet. Liganden dieser Art können mit Metallatomen der 8. Nebengruppe des Periodensystems hemilabile Komplexe bilden. Unter diesen heterofunktionalisierten Phosphoniten, Arsenoniten oder Stiboniten werden Verbindungen mit einem Atom der fünften Hauptgruppe des Periodensystems (P, As, Sb) verstanden, das ein freies Elektronenpaar und zwei Einfachbindungen zu jeweils einem Sauerstoffatom und eine Einfachbindung zu einem Kohlenstoffatom besitzt. Die allgemeinen Formeln I bis IV und die Beispiele der Tabelle 1 zeigen mögliche Liganden für das erfindungsgemäße Verfahren.

[0021] Die Liganden enthalten neben dem Atom der 5. Hauptgruppe mindestens ein weiteres Heteroatom mit mindestens einem freien Elektronenpaar. Das Atom der fünften Hauptgruppe und das weitere Heteroatom sind im Ligand derart angeordnet, daß ein Metallatom intramolekular an diesen beiden Atomen gleichzeitig koordiniert sein kann. Die trifft zum Beispiel zu, wenn ein Phosphoratom, ein Heteroatom und die dazwischenliegenden Atome mit dem koordinierten Metallatom einen 4 bis 15-, bevorzugt 8 bis 12-gliedrigen Ring, bilden können. Dieser Ring kann in den allgemeinen Formel I bis IV über das Metall der 8. Nebengruppe, das Atom X und den Substituenten Q²-Y gebildet werden.

[0022] Die in dem Rest Y enthaltenen Heteroatome können Sauerstoff, Schwefel, Stickstoff, Fluor, Chlor, Brom oder Jod sein. Die Heteroatome können in funktionellen Gruppen wie z.B. Ethern, Thioethern und tertiären Aminen enthalten sein und/oder Teil einer Kette oder eines Ringes sein. Es ist auch möglich, daß die Liganden mehr als ein Heteroatom enthalten, das diesen Forderungen entspricht. Die erfindungsgemäß eingesetzten Liganden sollten eine koordinative Bindung zwischen Heteroatom und Metall aufweisen, die eine geringere Stärke besitzt, als die zwischen dem Atom der fünften Hauptgruppe, d.h. P, As, Sb und dem Metall.

[0023] In der Fachliteratur werden Liganden, die neben einer starken Wechselwirkung zu einem Metall eine zweite, aber deutlich schwächere (labile) Wechselwirkung aufweisen, oft als hemilabile Liganden bezeichnet (Übersichtsartikel: A. Bader, E. Linder, Coord. Chem. Rev. 1991, 108, 27-110; C. S. Slone, D. A. Weinberger, C. A. Mirkin, Prog. Inorg. Chem. 1999, 48, 233). Für einige Literaturbeispiele konnte anhand von Röntgenstrukturen die zweite, schwächere Wechselwirkung des Liganden mit dem Metall nachgewiesen werden. Für die vorliegenden heterofunktionalisierten Liganden ist das Koordinationsverhalten nicht bekannt, es kann aber aus sterischen Überlegungen geschlossen werden, daß jeweils eine Koordination des Metallatoms über z. B. ein Phosphoratom und ein zusätzliches Heteroatom möglich ist.

[0024] Die im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten Liganden der allgemeinen Formeln I, II, III oder IV bilden vermutlich eine hemilabile Bindung über die Gruppe mit der Bezeichnung Y aus. Der Bisarylsubstituent mit der funktionellen Gruppe Y stellt ein wichtiges Merkmal der im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten Liganden dar, da mit diesen Liganden hemilabile Bindungen zum Zentralmetall des Katalysatorkomplexes ausgebildet werden können.

[0025] Das erfindungsgemäße Verfahren kann mit verschiedenen Katalysatoren und/oder Liganden durchgeführt

werden.

[0026] Als katalytisch aktives Metall kommen die Metalle der 8. Nebengruppe des Periodensystems der Elemente in Frage, wie Rhodium, Kobalt, Platin oder Ruthenium.

[0027] Der aktive Katalysatorkomplex für die Hydroformylierung wird dabei aus einem Salz oder einer Verbindung des Metalls (Katalysatorvorläufer), dem Liganden und Synthesegas gebildet, zweckmäßig geschieht dies in situ während der Hydroformylierung. Übliche Katalysatorvorläufer sind beispielsweise Octanoate oder Acetylacetonate. Das molare Verhältnis zwischen Metall und Ligand liegt bei 1/1 bis 1/1000, bevorzugt zwischen 1/1 und 1/50. Die Konzentration des Metalls im Reaktionsgemisch liegt im Bereich von 1 ppm bis 1000 ppm, vorzugsweise im Bereich 5 ppm bis 300 ppm. Die Reaktionstemperaturen des erfindungsgemäßen Verfahrens liegen zwischen 60 °C und 180 °C, vorzugsweise zwischen 90 °C und 150 °C, die Drücke betragen 1-300 bar, vorzugsweise 15-60 bar.

Der Katalysator, d. h. Metall und Ligand ist homogen im Hydroformylierungsgemisch, bestehend aus Edukt (Olefin) und Produkt (Aldehyde, Alkohole, Hochsieder), gelöst. Optional kann zusätzlich ein Lösungsmittel, z. B. Toluol, Texanol, hochsiedende Rückstände aus dem Oxoprozeß oder Phthalate wie Di(2-ethyl-hexyl)phthalat, verwendet werden.

[0028] Die Edukte für eine Hydroformylierung gemäß dem Verfahren der Erfindung sind Olefine oder Gemische von Olefinen, insbesondere Monoolefine mit 3 bis 24, bevorzugt 4 bis 16, besonders bevorzugt 3 bis 12 Kohlenstoffatomen mit end- oder innenständigen C-C-Doppelbindungen, wie z. B. 1- oder 2-Penten, 2-Methylbuten-1, 2-Methylbuten-2, 3-Methylbuten-1, 1-,2- oder 3-Hexen, das bei der Dimerisierung von Propen anfallende C₆-Olefinmisch (Dipropen), Heptene, 2- oder 3-Methyl-1-hexen, Octene, 2-Methylheptene, 3-Methylheptene, 5-Methylhepten-2, 6-Methylhepten-2, 2-Ethylhexen-1, das bei der Dimerisierung von Butenen anfallende isomere C₈-Olefinmisch (Dibuten), Nonene, 2- oder 3-Methyloctene, das bei der Trimerisierung von Propen anfallende C₉-Olefinmisch (Tripropen), Decene, 2-Ethyl-1-octen, Dodecene, das bei der Tetramerisierung von Propen oder der Trimerisierung von Butenen anfallende C₁₂-Olefinmisch (Tetrapropen oder Tributen), Tetradece, Hexadecene, das bei der Tetramerisierung von Butenen anfallende C₁₆-Olefinmisch (Tetrabuten) sowie durch Cooligomerisierung von Olefinen mit unterschiedlicher Anzahl von Kohlenstoffatomen (bevorzugt 2 bis 4) hergestellte Olefinmische, gegebenenfalls nach destillativer Trennung in Fraktionen mit gleicher oder ähnlicher Kettenlänge. Ebenfalls können Olefine oder Olefinmische, die durch Fischer-Tropsch-Synthese erzeugt worden sind, sowie Olefine, die durch Oligomerisierung von Ethen erhalten wurden oder Olefine, die über Methathesereaktionen zugänglich sind, eingesetzt werden. Bevorzugte Edukte sind C₄-, C₈-, C₉-, C₁₂- oder C₁₆-Olefinmische.

[0029] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren können unter Verwendung der heterofunktionalisierten Liganden α -Olefine, verzweigte, innenständige und innenständig verzweigte Olefine mit hohen Raum-Zeit-Ausbeuten hydroformyliert werden. Bemerkenswert ist dabei die hohe Ausbeute an endständig hydroformyliertem Olefin, selbst wenn im Edukt nur ein geringer Anteil an Olefinen mit endständiger Doppelbindung vorhanden waren.

[0030] Die folgenden Beispiele sollen die Erfindung weiter erläutern, nicht aber ihren Anwendungsbereich beschränken, der sich aus den Patentansprüchen ergibt.

Beispiele 1 - 17 (Oxierung von Octenen)

[0031] In einen 200 ml-Autoklaven wurden unter Schutzgas 30 ml reines trockenes Toluol, 1,875 mg (0,00604 mmol) [acacRh(COD)] (Rhodiumcyclooctadienylacetylacetonat), gelöst in 10 ml Toluol, und 0,00604 bzw. 0,01208 mmol des jeweiligen Liganden, gelöst in 1 ml Toluol, gefüllt. In eine Druckpipette über dem Reaktor gab man 15 ml (10,62 g, 94,63 mmol) Octengemisch (Zusammensetzung siehe Tabelle 2). Reaktor und Druckpipette wurden über einen der Druckregelstrecke parallel geschalteten Bypass mit 33 bar CO/H₂ (1/1 Synthesegas) beaufschlagt und der Reaktorinhalt unter Rühren mit einem Begasungsrührer mit 1500 Upm auf die Reaktionstemperatur gebracht. Nach Druckerhöhung auf 45 bis 47 bar wurde das Olefinmisch aus der Druckpipette in den Reaktor gedrückt. Die vorgesehene Temperatur und der Solldruck wurden eingestellt. Der Bypass wurde geschlossen und der Druck über die gesamte Reaktionszeit mit einem Druckregler konstant (50 bar bei den Beispielen 1-11) gehalten. Der Versuch wurde unter Zwangskühlung beendet, wenn die mit einem Gasflussmesser beobachteten Gasverbrauchsdaten unter 2 ml/min abfielen. Die Reaktionslösung wurde unter Schutzgas entnommen und gaschromatographisch analysiert.

[0032] Für die in der Tabelle 3 zusammengefaßten Beispiele 1 - 11 wurden zwei Mischungen (A und B) von Octenen eingesetzt (Zusammensetzung siehe Tabelle 2). Die Nummerierung der eingesetzten Phosphonitliganden (Ia, Ib, IIa, IIb, IIc) entspricht der in Tabelle 1.

Tabelle 2

	A (Gew.-%)	B (Gew.-%)
n-Octen-1	9,8	3,4
cis+trans-Octen-2	70,0	49,8

Tabelle 2 (fortgesetzt)

	A (Gew.-%)	B (Gew.-%)
cis+trans-Octen-3	15,5	30,0
cis+trans-Octen-4	4,7	16,8

Tabelle 3

Beispiel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ligand	I-a	I-a	I-a	I-a	I-a	II-a	II-a	II-a	II-a	II-a	II-a
Octenmischung	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	B
P/Rh	1/1	2/1	1/1	1/1	1/1	1/1	2/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Temperatur (°C)	120	120	140	120	120	120	120	140	120	140	120
Druck (bar)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Zeit (h)	4	4	4	4	3	3	2	3	3	3	3
Zusammensetzung der Aldehyde in %											
Nonanal	29,5	29,2	31,8	28,5	29,7	29,1	27,4	33,0	30,6	32,0	29,1
2-Methyloctanal	39,3	39,4	37,9	38,8	39,4	38,4	38,1	37,1	38,6	37,6	37,3

3-Ethylheptanal	16,6	16,7	16,1	17,2	16,5	17,5	18,6	15,9	16,6	15,6	17,7
4-Propylhexanal	14,6	14,7	14,2	15,5	14,4	15,0	15,9	14,0	14,2	14,8	15,9
Ausbeute in %	89	94	91	95	86	98	98	97	99	88	98

Beispiel	12	13	14	15	16	17	Vergleich
Ligand	II-c	II-c	II-c	II-c	II-c	II-c	Phosphit
Octenmischung	B	B	B	B	B	B	B
P/Rh	1/1	5/1	10/1	20/1	50/1	50/1	20/1
Temperatur (°C)	140	140	140	140	140	140	140
Druck (bar)	20	20	20	20	20	20	20
Zeit (h)	6	6	6	6	6	6	6
Zusammensetzung der Aldehyde in %							
Nonanal	31,7	41,0	47,8	45,9	47,9	41,8	24,5
2-Methyloctanal	38,4	33,7	30,0	30,4	27,6	31,9	37,4
3-Ethylheptanal	15,9	13,5	11,8	12,6	12,9	14,0	21,2
4-Propylhexanal	14,0	11,8	10,4	11,1	11,6	12,3	16,9
Ausbeute in %	21,0	37,7	51,9	76,6	86,0	72,7	89,3

Bemerkung zu Beispiel 17:

[0033] Dreifache Olefinkonzentration, inverse Versuchsdurchführung: Olefin vorgelegt und temperiert, Rh und Ligand in Toluol gelöst, aus Pipette zugegeben.

EP 1 099 677 A1

Vergleichsbeispiel

[0034] Es wurde unter den Bedingungen von Beispiel 12 oxiert, an Stelle des heterofunktionalisierten Phosphonits wurde aber ein Phosphitligand (Tris[2.4-ditertbutylphenyl]phosphit) verwendet. Der Anteil an Nonanal an der Gesamtaldehydmenge betrug 24,5%.

Beispiele 18 - 21 (Oxierung von Di-n-buten)

[0035] Die Versuche 18 - 21 wurden analog den Versuchen 1 - 17 durchgeführt. Als Olefin wurde dimerisiertes n-Buten (Di-n-buten) eingesetzt. Der Anteil an Olefin mit endständiger Doppelbindung (im Wesentlichen Octen-1, 3-Methylhepten-1, 5-Methylhepten-1, 2-Ethylhexen-1, 3.4-Dimethylhexen-1, 2-Ethyl-3-Methylpenten-1) beträgt unter 5%.

[0036] Die Versuche wurden nach jeweils 8 h beendet.

Tabelle 4


Beispiel	18	19	20	21
Temperatur (°C)	140	140	150	130
Druck (bar)	20	20	30	30
Zeit (h)	8	8	8	8
Rh-Konzentration (ppm)	20	150	150	20
P/Rh	10	10	10	10
Olefin	<u>Di-n-buten</u>	<u>Di-n-buten</u>	<u>Di-n-buten</u>	<u>Di-n-buten</u>
Ligand	II-a	II-a	II-a	II-a
Umsatz (%)	19,5	30,2	52,4	29,0
n % *	41,3	40,3	38,8	35,4

* Anteil der durch endständige Oxierung entstandenen Aldehyde (im Wesentlichen Nonanal, 4-Methyloctanal, 3-Ethylheptanal, 6-Methyloctanal, 4,5-Dimethyl-heptanal) an der Gesamtmenge an gebildeten Aldehyden

[0037] In den Beispielen 18 - 21 zeigt sich, daß mit den neuen Katalysatorsystemen auch bei der Oxierung von technischen Olefingemischen, die hauptsächlich verzweigte Olefine mit innenständigen Doppelbindungen enthalten, ein hoher Anteil an endständig hydroformyliertem Produkt erhalten wird.

Patentansprüche

- Verfahren zur katalytischen Hydroformylierung von Olefinen mit 3 bis 24 Kohlenstoffatomen, dadurch gekennzeichnet, daß als Katalysator ein Metall der 8. Nebengruppe des Periodensystems in Gegenwart eines Liganden der Formel I




mit

X = As, Sb, P,
 R^1_{a-d}, R^2_{a-d} = H, aliphatischer oder aromatischer Kohlenwasserstoffrest, aliphatische oder aromatische Alkoxygruppe, jeweils mit 1 bis 25 Kohlenstoffatomen, wobei R^1_{a-d} und R^2_{a-d} jeweils gleich oder verschieden sein können,
 Q^1, Q^2, Q^3, Q^4 = O, S, NR^7 , CR^7R^8 , wobei R^7 und R^8 gleich oder verschieden und eine der Bedeutungen von R^1_a besitzen können, mit der Maßgabe, daß entweder Q^3 oder Q^4 O, S, NR^7 bedeuten,
 n, m, o, p = 0 oder 1, mit der Maßgabe, daß entweder o oder p 1 ist,
 Y = $-O-R^5$, $-COOR^5$, $-COOM$, $-SR^5$, $-NR^5R^6$, $-N=CR^5R^6$, $-COR^5$, $-CONR^5R^6$, $-F$, $-Cl$, $-Br$, $-I$ wobei R^5 und R^6 gleich oder verschieden sein können und H, einen aliphatischen oder aromatischen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 25 Kohlenstoffatomen bezeichnen und M = H, Li, Na, K oder NH_4 bedeuten und
 Z^1, Z^2 = substituierter oder unsubstituierter, aliphatischer oder aromatischer Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 75 Kohlenstoffatomen, wobei Z^1 und Z^2 eine kovalente Verknüpfung aufweisen können,

eingesetzt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Hydroformylierung in Gegenwart eines Liganden der Formel II



mit

X =

$R^1_{a-d}, R^2_{a-d}, R^3_{a-c}, R^4_{a-c}$

As, Sb, P,

H, aliphatischer oder aromatischer Kohlenwasserstoffrest, aliphatische oder aromatische Alkoxygruppe, jeweils mit 1 bis 25 Kohlenstoffatomen, wobei R^1_{a-d} , R^2_{a-d} , R^3_{a-c} und R^4_{a-c} jeweils gleich oder verschieden sein können,

$Q^1, Q^2, =$

O, S, NR^7 , CR^7R^8 , wobei R^7 und R^8 gleich oder verschieden und eine der Bedeutungen von R^1_a besitzen können,

n, m, =

0 oder 1 und


Y =

$-OR^5$, $-COOR^5$, $-COOM$, $-SR^5$, $-NR^5R^6$, $-N=CR^5R^6$, $-COR^5$, $-CONR^5R^6$, $-F$, $-Cl$, $-Br$, $-I$

wobei R^5 und R^6 gleich oder verschieden sein können und H, einen aliphatischen oder aromatischen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 25 Kohlenstoffatomen bezeichnen und $M = H, Li, Na, K$ oder NH_4 bedeuten,

durchgeführt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Hydroformylierung in Gegenwart eines Liganden der Formel III



mit

X =
 $R^1_{a-d}, R^2_{a-d}, R^3_{a-d}, R^4_{a-d},$ =

$Q^1, Q^2,$ =

Q^4 =

n, m, p =

Y =

As, Sb, P,

H, aliphatischer oder aromatischer Kohlenwasserstoffrest, aliphatische oder aromatische Alkoxygruppe, jeweils mit 1 bis 25 Kohlenstoffatomen, wobei $R^1_{a-d}, R^2_{a-d}, R^3_{a-d}, R^4_{a-d}$ jeweils gleich oder verschieden sein können,

O, S, NR^7 , CR^7R^8 , wobei R^7 und R^8 gleich oder verschieden und eine der Bedeutungen von R^1_a besitzen können,


CR^7R^8 , wobei R^7 und R^8 gleich oder verschieden sein können und eine der Bedeutungen von R^1_a besitzen können,

0 oder 1,

$-OR^5$, $-COOR^5$, $-COOM$, $-SR^5$, $-NR^5R^6$, $-N=CR^5R^6$, $-COR^5$, $-CONR^5R^6$, $-F$, $-Cl$, $-Br$, $-I$ wobei R^5 und R^6 gleich oder verschieden sein können und H, einen aliphatischen oder aromatischen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 25 Kohlenstoffatomen bezeichnen und M = H, Li, Na, K oder NH_4 bedeuten,

durchgeführt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß die Hydroformylierung in Gegenwart eines Liganden der Formel IV



mit

X =
 $R^1_{a-d}, R^2_{a-d}, R^3_{a-d}, R^4_{a-d}$

As, Sb, P,

H, aliphatischer oder aromatischer Kohlenwasserstoffrest, aliphatische oder aromatische Alkoxygruppe, jeweils mit 1 bis 25 Kohlenstoffatomen, wobei $R^1_{a-d}, R^2_{a-d}, R^3_{a-d}$ und R^4_{a-d} jeweils gleich oder verschieden sein können,

$Q^1, Q^2 =$

O, S, NR^7 , CR^7R^8 , wobei R^7 und R^8 gleich oder verschieden und eine der Bedeutungen von R^1_a besitzen können,

$Q^3 =$

CR^7R^8 , wobei R^7 und R^8 gleich oder verschieden sein können und eine der Bedeutungen von R^1_a besitzen können,

$n, m, o, =$

0 oder 1,

Y =

$-OR^5, -COOR^5, -COOM, -SR^5, -NR^5R^6, -N=CR^5R^6, -COR^5, -CONR^5R^6, -F, -Cl, -Br, -I$ wobei R^5 und R^6 gleich oder verschieden sein können und H, einen aliphatischen oder aromatischen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 25 Kohlenstoffatomen bezeichnen und M = H, Li, Na, K oder NH_4 bedeuten,

durchgeführt wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß als Metall der 8. Nebengruppe des Periodensystems Kobalt oder Rhodium eingesetzt wird.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß Olefine mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen eingesetzt werden.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 00 12 1487

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X,D	WO 98 43935 A (URATA HISAO ;WADA YASUHIRO (JP); MITSUBISHI CHEM CORP (JP)) 8. Oktober 1998 (1998-10-08) & DATABASE WPI Week 9846 Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 1998-542597 * Zusammenfassung *	1-6	C07C45/50 C07C47/02 B01J31/24
P,X	DETLEF SELENT ET AL.: "Novel Oxyfunctionalized Phosphonite Ligands for the Hydroformylation of Isomeric n-Olefins" ANGEW. CHEM. INT. ED. , Bd. 39, Nr. 9, 2000, Seiten 1639-41, XP000941861 * das ganze Dokument *	1-3,5,6	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			C07C B01J
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort MÜNCHEN		Abschlußdatum der Recherche 22. Januar 2001	Prüfer Seufert, G
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur		T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03/82 (P/AC/03)

EP 1 099 677 A1

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 12 1487

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten
Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

22-01-2001

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9843935 A	08-10-1998	AU 6518398 A	22-10-1998

EPO FORM P0481

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82